



BIRD

BELGIAN INFLAMMATORY
BOWEL DISEASE RESEARCH
AND DEVELOPMENT



BIN Astoria

Belgian IBD nurses and study coordinators association

BEDANKT

Beste deelnemer aan de REScUE-studie,

Dankzij uw deelname is de REScUE-studie met succes afgerond, en de resultaten zijn ondertussen gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift. Daarom willen we u graag informeren over deze resultaten.

Zonder uw hulp was dit niet mogelijk geweest - hartelijk dank!

Waarom werd de REScUE-studie uitgevoerd?

De REScUE-studie was een onderzoek bij patiënten met de ziekte van Crohn die behandeld werden met Stelara® (ustekinumab). De ziekte raakte hiermee in eerste instantie goed onder controle. Bij herval van de klachten na verloop van tijd werd onderzocht of er baat was bij een extra startdosis via infuus.

In de studie werd na deze extra dosis via een infuus de onderhoudsbehandeling onderhuids toegediend in twee groepen:

- Volgens standaard schema (één injectie elke 8 weken)
- Volgens aangepast schema (één injectie elke 4 weken)

Het doel van de studie was om te onderzoeken of deze extra startdosis via infuus kon helpen om de ziekte opnieuw onder controle te krijgen, en of het aangepaste schema met injecties om de 4 weken betere resultaten gaf dan het standaardschema.

Wie deed er mee aan de studie?

- De studie liep in 17 ziekenhuizen in België.
- In totaal namen 108 patiënten deel.
- Elke deelnemer werd gedurende 48 weken opgevolgd

Wat hebben we geleerd?

De resultaten tonen aan dat:

- Ongeveer de helft van de patiënten opnieuw verbetering vertonen na een extra infuus met ustekinumab (ongeacht welk onderhoudsschema ze daarna kregen)
- De kans om de ziekte van Crohn opnieuw onder controle te krijgen voor beide groepen dus gelijkaardig was (één injectie elke 4 weken vs. één injectie elke 8 weken).
- De meeste patiënten die opnieuw baat hadden bij de behandeling, een gunstige evolutie vertoonden binnen de eerste 24 weken na de herintroductie met ustekinumab via infuus.
- Één enkele toediening met ustekinumab via infuus voldoende lijkt voor patiënten met verlies van effect.

Kortom: een extra infuus met ustekinumab is een waardevolle optie voor patiënten met de ziekte van Crohn die eerder hun respons verloren, maar het effect moet binnen de eerste 6 maanden zichtbaar zijn. Een strikte opvolging van het ziekteverloop blijft dus zeer belangrijk om te beoordelen of de behandeling werkt.

De REScUE-resultaten zijn nu gepubliceerd (engels):

[www.gastrojournal.org/article/S0016-5085\(26\)00146-0](http://www.gastrojournal.org/article/S0016-5085(26)00146-0)

Uw deelname heeft rechtstreeks bijgedragen aan nieuwe inzichten over de behandeling van de ziekte van Crohn.

Elke bloedafname, vragenlijst en afspraak heeft geholpen om dit mooie resultaat te bereiken.

Namens het hele onderzoeksteam: duizendmaal dank!

Samen hebben we een belangrijke stap gezet in het verbeteren van de zorg voor patiënten met inflammatoire darmziektes.

Met vriendelijke groeten,
Het REScUE-studieteam

BIRD vzw, Leuvensesteenweg 643, 1930 Zaventem, BE0465587924, RPR Brussel

